



คำแนะนำในการรับ วัคซีนโควิด-19 สำหรับ ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ และโรคแพ้ภูมิตัวเอง



1

ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบและโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นผู้ป่วยที่มักจะได้รับยากดภูมิคุ้มกัน จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด-19 แล้วจะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป **จึงควรได้รับวัคซีนโควิด-19**

2

ไม่มีข้อห้ามในการรับวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ **สามารถรับวัคซีนได้ทุกชนิดที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน** ยกเว้นในรายชื่อแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน

3

การตอบสนองต่อวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบและโรคแพ้ภูมิตัวเองที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันอยู่ อาจไม่สูงและยาวนานเหมือนกับบุคคลทั่วไป

4

ในทางทฤษฎีผู้ป่วยโรคข้ออักเสบและโรคแพ้ภูมิตัวเอง อาจจะมีโอกาสเกิดอาการโรคกำเริบได้ ภายหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 แต่ประโยชน์จากการได้รับวัคซีนมากกว่าความเสี่ยงต่อโรคกำเริบ

5

ช่วงเวลาที่เหมาะสมของการรับวัคซีน คือ ระยะเวลาที่ **โรคลดลง** และ **ควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแล** เพื่อรับคำแนะนำการปรับแผนการรักษากรณีมีการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน

6

ญาติหรือผู้ดูแลที่ใกล้ชิดผู้ป่วยควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมด้วย เพื่อเป็นการปกป้องผู้ป่วย



ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนโควิด-19 โดยตรงในผู้ป่วยกลุ่มนี้ คำแนะนำนี้อ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนอื่นๆ ที่พบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจจะตอบสนองได้น้อยกว่าคนปกติ แต่โดยทั่วไปแล้ววัคซีนโควิด-19 สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและความรุนแรงของโรคโควิด-19 ได้ จึงแนะนำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนโควิด-19